

種類	同一ワクチンでの接種要領					
	対象年齢	標準的な接種(開始)年齢等	接種回数	定められている接種間隔等	標準的な接種間隔	
子宮頸がん予防 ・サーバリックス ・ガーダシル  ※3回とも同じ ワクチンを接種	12歳となる日の属する年度内(小6)から 16歳となる日の属する年度内(高1相当)の女子  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">             ※現在、積極的にはお勧めしていません。              有効性とリスクを十分ご理解の上、接種し              てください。           </div>	<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">             サーバリックスの場合           </div>	3 回	1回目	—	—
		中学1年生		2回目	1回目から1か月以上の間隔をおいて	1回目から1か月後
				3回目	1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上の間隔をおいて	1回目から6か月後
		<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">             ガーダシルの場合           </div>	3 回	1回目	—	—
		中学1年生		2回目	1回目から1か月以上の間隔をおいて	1回目から2か月後
				3回目	2回目から3か月以上の間隔をおいて	1回目から6か月後