


こどもの定期予防接種スケジュール

標準的(勧められている)接種時期 定期接種の対象年齢 必要な間隔 令和3年4月



(*) Hib・小児用肺炎球菌は、7か月を過ぎて接種を開始した場合、標準接種(7か月までに開始)とは接種回数や接種できる期間が異なります。詳しくは、「予防接種とこどもの健康」や「予防接種一覧表」をご覧ください。下記までお問い合わせください。

ワクチン	対象年齢	回数	標準的な接種間隔
ロタ	ロタリックス R2.10月以降生まれ 以降生まれ	合計2回	27日(4週)以上の間隔で24週までに接種
	ロタテック	合計3回	27日(4週)以上の間隔で32週までに接種
Hib (ヒブ)	生後2か月～5歳に至るまで	初回3回 追加1回	27～56日(4～8週)の間隔で1歳までに接種 初回3回終了後、7～13か月の間隔で接種
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳に至るまで	初回3回 追加1回	27日(4週)以上の間隔で2歳までに接種 ②2回目は1歳までに接種 初回3回終了後、60日以上の間隔で1歳～1歳3か月の間に接種
B型肝炎	1歳に至るまで	3回	27日(4週)以上の間隔で2回接種。1回目から139日(20週)以上の間隔で3回目を接種

ワクチン	対象年齢	回数	標準的な接種間隔
4種混合	生後3か月～7歳半に至るまで	初回3回 追加1回	20～56日(3～8週)の間隔で接種 初回3回終了後、12～18か月の間隔で接種
BCG	1歳に至るまで	1回	-
麻しん・風しん (MR)	【1期】1歳～2歳に至るまで 【2期】小学校入学前の1年間	1回 1回	- -
水痘	1歳～3歳に至るまで	2回	6～12か月の間隔で接種
日本脳炎	【1期】生後6か月～7歳半に至るまで 【2期】9歳～13歳未満	初回2回 追加1回 1回	6～28日(1～4週)の間隔で接種 初回2回終了後、おおむね1年の間隔で接種 -
2種混合	11歳～13歳未満	1回	-

違う種類のワクチンを接種する場合、間隔の制限があるもの

注射生ワクチン → 27日以上 → 違う種類の注射生ワクチン

BCG・麻しん風しん(MR) 水痘・おたふくかぜなど

*月曜日に接種した場合、4週後の月曜日から接種できます

日本脳炎 特別対象者	① 平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれで、9歳～13歳未満 ② 平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれで、20歳未満	全4回のうち不足している回数を定期接種として無料で接種することができます。
子宮頸がん予防	現在積極的にはお勧めしていませんが、定期接種として無料で接種することができます。	

【問合せ先】 茨木市 こども育成部 子育て支援課 (茨木市子ども健康センター内)
☎567-0031 茨木市春日三丁目13番5号
☎072-621-5901

☆ 定期予防接種についてわからないことがあればお問い合わせください ☆