

こどもの定期予防接種スケジュール



標準的(勧められている)接種時期
定期接種の対象年齢
→ 必要な間隔

令和8年4月1日現在

| ワクチンの種類 | 回数 | 出生 | 6週 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 1歳 | 1歳6か月 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 |
|--|----------------|----|----|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|----|----|----|----|----|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 小児用肺炎球菌 15価・20価 <small>不活化ワクチン</small> | 4回(*) | | | ① 27日以上 | ② 27日以上 | ③ | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B型肝炎 <small>不活化ワクチン</small> | 3回 | | | ① 27日以上 | ② | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロタ ロタリックス <small>経口生ワクチン</small> | 2回 | | | ① 27日以上 | ② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経口生ワクチン ロタテック | 3回 | | | ① 27日以上 | ② 27日以上 | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5種混合 DPT-IPV-Hib (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ) <small>不活化ワクチン</small> | 4回 | | | ① 20~56日 | ② 20~56日 | ③ | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BCG <small>注射生ワクチン</small> | 1回 | | | | | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 麻しん・風しん(MR) <small>注射生ワクチン</small> | 2回 | | | | | | | | | | | | | 【1期】① | | | | | | | 【2期】② | | | | | | | | | |
| 水痘(水ぼうそう) <small>注射生ワクチン</small> | 2回 | | | | | | | | | | | | | ① | ② | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本脳炎 <small>不活化ワクチン</small> | 4回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2種混合 DT (ジフテリア・破傷風) <small>不活化ワクチン</small> | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HPV子宮頸がん予防 (シルガード9) <small>不活化ワクチン</small> | 2回 又は 3回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Hib・小児用肺炎球菌は、7か月を過ぎて接種を開始した場合、標準接種(7か月までに開始)とは接種回数や接種できる期間が異なります。詳しくは、「予防接種とこどもの健康」や「予防接種一覧表」をご覧ください。下記までお問い合わせください。

24週以降、接種不可

32週以降、接種不可

1歳になったらできるだけ早く

小学校入学前の1年間
(幼稚園保育園等の年長児)
4/1から3/31まで

6~12か月
(3か月あければ接種可)

① 6~28日 ② 1年 ③
(6か月あければ接種可)

小6~高1相当の女子
(1回目が15歳に至るまでの場合、2回目を5か月あけて接種すれば2回で完了)

①2か月②
③
1回目から6か月

| ワクチン | 対象年齢 | 回数 | 標準的な接種間隔 |
|-----------------------|--|--------------|--|
| 小児用肺炎球菌 15価・20価 | 生後2か月~5歳に至るまで | 初回3回 追加1回 | 27日(4週)以上の間隔で2歳までに接種 ②2回目は1歳までに接種 初回3回終了後、60日以上の間隔で1歳~1歳3か月の間に接種 |
| B型肝炎 | 1歳に至るまで | 3回 | 27日(4週)以上の間隔で2回接種。1回目から139日(20週)以上の間隔で3回目を接種 |
| ロタ ロタリックス ロタテック | 出生6週0日後~ 出生24週0日後まで 出生6週0日後~ 出生32週0日後まで | 2回 3回 | 27日(4週)以上の間隔で24週までに接種 27日(4週)以上の間隔で32週までに接種 |
| 5種混合 | 生後2か月~7歳半に至るまで | 初回3回 追加1回 | 20~56日(3~8週)の間隔で接種 初回3回終了後、6~18か月の間隔で接種 |

| ワクチン | 対象年齢 | 回数 | 標準的な接種間隔 |
|------------|------------------------------------|--------------------|--|
| BCG | 1歳に至るまで | 1回 | - |
| 麻しん風しん(MR) | 【1期】1歳~2歳に至るまで 【2期】小学校入学前の1年間 | 1回 1回 | - - |
| 水痘 | 1歳~3歳に至るまで | 2回 | 6~12か月の間隔で接種 |
| 日本脳炎 | 【1期】生後6か月~7歳半に至るまで 【2期】9歳~13歳未満 | 初回2回 追加1回 1回 | 6~28日(1~4週)の間隔で接種 初回2回終了後、おおむね1年の間隔で接種 - |
| 2種混合 | 11歳~13歳未満 | 1回 | - |

| | | | |
|-------------------|----|---------------------------------------|-----------------------|
| 麻しん風しん(MR)経過措置対象者 | 1期 | 令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれてMR第1期を接種していない人 | 令和9年3月31日まで接種可能 |
| | 2期 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれてMR第2期を接種していない人 | |
| 日本脳炎特例対象者 | | 平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれて20歳未満 | 不足している回数を接種することができます。 |

| ワクチン | 対象年齢 | 回数 | 標準的な接種間隔 |
|-----------|---|----------|---|
| HPV 9価 | 小6~高1相当の女子 15歳に至った日から開始 15歳に至るまでに開始 | 3回 2回 | 2か月の間隔で2回、1回目から6か月の間隔で1回 1回目から6か月の間隔で1回 ※5か月未満の場合は3回接種 |
| RSウイルス感染症 | 妊娠28週から37週に至る(36週6日)まで | 1回 | - |

違う種類のワクチンを接種する場合、間隔の制限があるもの

注射生ワクチン → 違う種類の注射生ワクチン

27日以上

* 月曜日に接種した場合、4週後の月曜日から接種できます。

【問合せ先】茨木市 子育て支援課 (おにくる 2F 茨木市立こども支援センター内)

☎ 567-0888 茨木市駅前三丁目9番45号 ☎ 072-624-9301

月曜~金曜日 8時45分から17時15分まで

[第2・4月曜日(祝日・振替休日と重なった場合は翌火曜日)、祝日、年末年始を除く]