

同一ワクチンでの接種要領

種類	同一ワクチンでの接種要領							
	対象年齢	標準的な接種(開始)年齢等	接種回数	定められている接種間隔等	標準的な接種間隔			
Hib (ヒブ)	生後2か月から60か月(5歳)に至るまで ※注意 接種開始年齢等によって、 接種回数や接種できる期間が異なります。	生後2か月から7か月に至るまでに開始	4回	初回	1回目	—	—	
				初回	2回目	1回目から27日(4週間)(医師が認める場合は20日)以上の間隔をおいて1歳に至るまでに	1回目から4～8週の間隔	
					3回目	2回目から27日(4週間)(医師が認める場合は20日)以上の間隔をおいて1歳に至るまでに	2回目から4～8週の間隔	
					(注意)初回接種を1歳に至るまでに完了できなかった場合、最後の初回接種から27日以上の間隔(医師が認めた場合は20日)で追加を1回接種して終了すること。		—	
			追加	3回目から7か月以上の間隔をおいて	3回目から7～13か月			
		標準的な期間に接種開始できない期間があった場合	a. 生後7か月に至った日の翌日から1歳に至るまでに開始した場合	3回	初回	1回目	—	—
					初回	2回目	1回目から27日(4週間)(医師が認める場合は20日)以上の間隔をおいて1歳に至るまでに	1回目から4～8週の間隔
						(注意)初回接種を1歳に至るまでに完了できなかった場合、最後の初回接種から27日以上の間隔(医師が認めた場合は20日)で追加を1回接種して終了すること。		—
				追加	2回目から7か月以上の間隔をおいて	2回目から7～13か月の間隔		
			b. 生後1歳に至った日の翌日から5歳に至るまでに開始した場合	1回(追加)	—	—		