

# 令和6年度 茨木市予防接種一覧表

令和6年10月1日現在

1 予防接種についての知識と理解を深めていただくために、説明書「予防接種と子どもの健康」や、予防接種予診票綴の注意事項をよく読んでから受けてください。接種を受ける際は、母子健康手帳と予診票をお持ちください。

2 予防接種の種類や接種方法は、今後の制度改正により変わることがあります。最新の情報は、茨木市のホームページや広報いばらきで確認してください。

茨木市 予防接種 こども

検索

## 定期（公的）接種



予防接種法に基づき、対象疾病、対象者、接種期間等が定められている予防接種です。

茨木市民が、茨木市の集団接種又は茨木市内の予防接種委託医療機関で接種を受ける場合は無料です。

定期（公的）接種の対象年齢や接種間隔等を守らなかった場合は、任意接種(有料)の扱いとなります。必ず守りましょう。

## ワクチンの種類と接種方法

定期（公的）接種の種類と接種方法については、裏面を参照してください。

## 接種の場所

＜個別接種＞ 茨木市内の予防接種委託医療機関（以下「委託医療機関」）で実施します。接種の際は、直接委託医療機関へ予約してください。委託医療機関は、右記二次元コードからご確認ください。（市ホームページの該当ページが開きます。）また、委託医療機関によっては、予約制の場合や、対象者を限定している場合がありますので、事前に医療機関に確認してください。



＜集団接種＞ BCGは、こども支援センターでも実施します。（個別接種も実施していますのでどちらかを選んでください。）

## 茨木市の委託医療機関以外で接種を受けたい場合

接種前と接種後に手続きが必要となります。他市区町村で接種を受ける際は、茨木市長から接種地の市区町村長（又は医療機関）宛ての「依頼書」が必要です。また接種後には窓口又は郵送での費用助成の申請が必要です。

※高槻市・吹田市・摂津市・豊中市・箕面市・池田市・島本町・能勢町・豊能町は「依頼書」が不要です。

1 依頼書を申請する前に、接種を希望する市区町村の予防接種担当部署に、次の4点を確認してください。

- ① 「茨木市に住民登録がありますが受け入れてもらえますか？」（受け入れ不可の場合があります）
- ② 「依頼書の宛名は？」（〇〇市長様・××クリニック御中 など）
- ③ 「依頼書の提出先は医療機関か市区町村か？」（接種地の市区町村で事前手続きが必要な場合があります）
- ④ 「接種費用は有料か無料か？」（有料であった場合、茨木市から費用の一部を助成します。）

※助成金の申請方法は、依頼書の申請時にお知らせしています。

依頼書を発行せずに接種を受けた場合、費用助成はできませんので、ご注意ください。

2 茨木市に依頼書の申請をしてください。※依頼書はそれぞれのワクチン1回分につき1枚発行します。

窓口申請



こども支援センター（駅前三丁目9番45号 おにクル2F）の窓口で即日交付します。

電子申請



右記二次元コードからご申請ください。（市ホームページの該当ページが開きます。）依頼書は後日郵送で交付します。到着まで1週間から10日程度かかりますので、日程に余裕を持ってご申請ください。



※ 二次元コードが利用できないときは、茨木市ホームページ内の検索バーに「こども 依頼書」と入れて検索してください。

## 任意接種



おたふくかぜ・インフルエンザ・定期接種外の年齢や時期に行う定期接種ワクチンなど  
予防接種法の対象となっていない予防接種です。費用は自己負担になります。

接種は、保護者と医師との相談によって判断し、行われる仕組みになっています。

接種を希望する場合は、直接、医療機関に問い合わせてください。

## 接種時年齢の考え方について



1歳(以上・から)

誕生日の前日から

1歳に至るまで・達するまで

誕生日の前日まで

1歳未満

誕生日の前日まで

月齢の場合も考え方は同じです。

(例) 令和6年6月15日生まれの人の場合、  
生後2か月から7か月に至るまでとは  
→令和6年8月14日から  
令和7年1月14日まで を言います。




## 接種間隔について



安全性とその効果のため、下記の間隔をあける必要があります。

### ◆違う種類のワクチンを接種する場合



### ◆同じ種類のワクチンを接種する場合の間隔

それぞれのワクチンに定められた間隔があります。定期(公的)接種の間隔については、裏面を参照してください。

定期(公的)接種の接種間隔を守らなかった場合は、任意接種(有料)の扱いとなりますのでご注意ください。

## BCG 集団接種



実施場所：茨木市立こども支援センター（おにクル2F）

| 年    | 月 | 日  | 曜 | 受付時間、定員                  | 年    | 月  | 日  | 曜 | 受付時間、定員                  |
|------|---|----|---|--------------------------|------|----|----|---|--------------------------|
| 令和6年 | 4 | 30 | 火 | 13時45分<br>14時45分<br>100人 | 令和6年 | 10 | 30 | 水 | 13時45分<br>14時45分<br>100人 |
|      | 5 | 31 | 金 |                          |      | 11 | 29 | 金 |                          |
|      | 6 | 21 | 金 |                          |      | 12 | 13 | 金 |                          |
|      | 7 | 26 | 金 |                          | 令和7年 | 1  | 31 | 金 |                          |
|      | 8 | 21 | 水 |                          |      | 2  | 21 | 金 |                          |
|      | 9 | 20 | 金 |                          |      | 3  | 28 | 金 |                          |

※ 予約制です(定員100人)。ご予約は、実施日の前月の初日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く。)から、電子申請で受け付けます。右記二次元コードからご申請ください。こども支援センター(駅前三丁目9番45号 おにクル2F)の窓口又は電話(072-624-9301)でも受け付けています。

※ 上表の日程については、やむを得ず変更する場合がありますので、予めご了承ください。

※ 茨木市内の委託医療機関(一部)でも接種できます。

※ 茨木市に暴風警報が発表された場合や感染症対策などにより、中止になることがあります。



# 定期（公的）接種の種類と接種方法

令和6年10月1日現在

| 種 類                                            |                       | 種類              | 定められている対象年齢                   | 標準的な接種（開始）年齢等                                                                             |        | 接種回数                           |                                                                              | 定められている接種間隔等                                                                                  |                                             | 標準的な接種間隔              |              |                 |  |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--|
| ロ<br>タ                                         | ロタリックス<br>ワクチン<br>の場合 | 経口<br>生<br>ワクチン | 出生6週0日後～<br>出生24週0日後まで        | 生後2か月から<br>出生14週6日後までに<br>1回目接種を開始                                                        |        | 2<br>回                         | 1回目                                                                          | —                                                                                             |                                             | —                     |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                | 2回目                                                                          | 1回目から27日（4週）以上の間隔を置いて                                                                         |                                             | 1回目から27日（4週）以上        |              |                 |  |
|                                                | ロタテック<br>ワクチン<br>の場合  | 経口<br>生<br>ワクチン | 出生6週0日後～<br>出生32週0日後まで        | ※出生15週0日後以降の1回目の接種は、重症症の発症が多くなる時期を避ける観点からお勧めしません。                                         |        | 3<br>回                         | 1回目                                                                          | —                                                                                             |                                             | —                     |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                | 2回目                                                                          | 1回目から27日（4週）以上の間隔を置いて                                                                         |                                             | 1回目から27日（4週）以上        |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                | 3回目                                                                          | 2回目から27日（4週）以上の間隔を置いて                                                                         |                                             | 2回目から27日（4週）以上        |              |                 |  |
| Hib<br>（ヒブ）                                    |                       | 不活化<br>ワクチン     | 生後2か月から<br>60か月（5歳）に<br>至るまで  | 生後2か月から<br>7か月に至るまでに開始                                                                    |        | 4<br>回                         | 初<br>回                                                                       | 1回目                                                                                           | —                                           |                       | —            |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                |                                                                              | 2回目                                                                                           | 1回目から27日（4週）（医師が認める場合は20日）以上の間隔を置いて1歳に至るまでに |                       | 1回目から4～8週の間隔 |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                |                                                                              | 3回目                                                                                           | 2回目から27日（4週）（医師が認める場合は20日）以上の間隔を置いて1歳に至るまでに |                       | 2回目から4～8週の間隔 |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                | ※注意 初回接種を1歳に至るまでに完了できなかった場合、最後の初回接種から27日以上の間隔（医師が認めた場合は20日）で追加を1回接種して終了すること。 |                                                                                               |                                             |                       |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        | 追加                             |                                                                              | 3回目から7か月以上の間隔を置いて                                                                             |                                             | 3回目から7～13か月           |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        | 初<br>回                         | 1回目                                                                          | —                                                                                             |                                             | —                     |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                | 2回目                                                                          | 1回目から27日（4週）（医師が認める場合は20日）以上の間隔を置いて1歳に至るまでに                                                   |                                             | 1回目から4～8週の間隔          |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                | ※注意 初回接種を1歳に至るまでに完了できなかった場合、最後の初回接種から27日以上の間隔（医師が認めた場合は20日）で追加を1回接種して終了すること。 |                                                                                               |                                             |                       |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        | 追加                             |                                                                              | 2回目から7か月以上の間隔を置いて                                                                             |                                             | 2回目から7～13か月の間隔        |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        | 追加                             |                                                                              | —                                                                                             |                                             | —                     |              |                 |  |
| 小児用<br>肺炎球菌<br>（15価）<br>（20価）<br>（※）           |                       | 不活化<br>ワクチン     | 生後2か月から<br>60か月（5歳）に<br>至るまで  | 初回                                                                                        | 4<br>回 | 初<br>回                         | 1回目                                                                          | —                                                                                             |                                             | —                     |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                | 2回目                                                                          | 1回目から27日（4週）以上の間隔を置いて2歳に至るまでに（ただし、初回2回目の接種が1歳を超えた場合、初回3回目の接種は行わず、初回2回目から60日以上の間隔で追加を1回接種して終了） |                                             | 1回目から4週以上の間隔で1歳に至るまでに |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                | 3回目                                                                          | 2回目から27日（4週）以上の間隔を置いて2歳に至るまでに                                                                 |                                             | 2回目から4週以上の間隔で1歳に至るまでに |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               | 追加                                                                                        |        | 3回目から60日以上の間隔を置いて、かつ1歳に至った日以降で |                                                                              | —                                                                                             |                                             |                       |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               | 初<br>回                                                                                    | 3<br>回 | a                              | 1回目                                                                          | —                                                                                             |                                             | —                     |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                | 2回目                                                                          | 1回目から27日（4週）以上の間隔を置いて2歳に至るまでに（2歳までに接種できなかった場合は、2回目は行わず、追加を1回接種して終了）                           |                                             | 1回目から4週以上の間隔で1歳に至るまでに |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        | 追加                             |                                                                              | 2回目から60日以上の間隔を置いて、かつ1歳に至った日以降で                                                                |                                             | —                     |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               | b                                                                                         | 初回     | 1回                             | —                                                                            |                                                                                               | —                                           |                       |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           | 追加     | 1回                             | 1回目から60日以上の間隔を置いて                                                            |                                                                                               | —                                           |                       |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               | c                                                                                         | 1<br>回 | 追加                             |                                                                              | —                                                                                             |                                             | —                     |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                |                                                                              |                                                                                               |                                             |                       |              |                 |  |
| B型肝炎                                           |                       | 不活化<br>ワクチン     | 生後12か月に至るまで                   | 1回目：生後2か月<br>2回目：生後3か月<br>3回目：生後7か月から8か月<br><br>※注意 母子感染予防として、出生後に接種している人は、定期接種の対象外となります。 |        | 3<br>回                         | 1回目                                                                          | —                                                                                             |                                             | —                     |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                | 2回目                                                                          | 1回目から27日（4週）以上の間隔を置いて                                                                         |                                             | —                     |              |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                | 3回目                                                                          | 1回目から139日（20週）以上の間隔を置いて1歳の誕生日の前日までに                                                           |                                             | —                     |              |                 |  |
| 4種混合<br>（DPT-IPV）<br><br>ジフテリア・百日せき<br>破傷風・ポリオ |                       | 不活化<br>ワクチン     | 生後2か月から<br>90か月（7歳半）に<br>至るまで | 生後2か月から<br>12か月に達するまでに開始                                                                  |        | 4<br>回                         | 1<br>期                                                                       | 初回                                                                                            | 1回目                                         | —                     |              | —               |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                |                                                                              | 2回目                                                                                           | 1回目から20日（3週）以上の間隔を置いて                       |                       | 1回目から3～8週の間隔 |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                |                                                                              | 3回目                                                                                           | 2回目から20日（3週）以上の間隔を置いて                       |                       | 2回目から3～8週の間隔 |                 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                |                                                                              | 追加                                                                                            |                                             | 3回目から6か月以上の間隔を置いて     |              | 3回目から12～18か月の間隔 |  |
|                                                |                       |                 |                               |                                                                                           |        |                                |                                                                              |                                                                                               |                                             |                       |              |                 |  |

| 種 類                                                          | 種類              | 定められている<br>対象年齢                                                                                    | 標準的な接種<br>(開始)年齢等                                            |                                        | 接種回数 |                                 | 定められている接種間隔等                                                                     | 標準的な接種間隔                                            |                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5種混合<br>(DPT-IPV-Hib)<br><br>ジフテリア・百日せき<br>破傷風・ポリオ・ヒブ<br>(※) | 不活化<br>ワクチン     | 生後2か月から<br>90か月(7歳半)に<br>至るまで                                                                      | 生後2か月から<br>7か月に至るまでに開始                                       |                                        | 4回   | 1期<br>初回<br>2回目<br>3回目<br>追加    | 1回目<br>1回目から20日(3週)以上の間隔を置いて<br>2回目から20日(3週)以上の間隔を置いて<br>3回目から6か月以上の間隔を置いて       | —<br>1回目から3～8週の間隔<br>2回目から3～8週の間隔<br>3回目から6～18か月の間隔 |                                             |
| BCG                                                          | 注射<br>生<br>ワクチン | 生後12か月に至るまで                                                                                        | 生後5か月から<br>8か月に至るまで                                          |                                        | 1回   |                                 | 1歳の誕生日の前日までに                                                                     | —                                                   |                                             |
| 麻しん風しん<br>混合(MR)                                             | 注射<br>生<br>ワクチン | 1期 生後12か月から<br>24か月(2歳)に至る<br>まで<br><br>2期 ※小学校就学前の<br>一年間で<br>5歳以上7歳未満                            | 1歳になったらなるべく早く<br><br>令和6年度の対象者<br>平成30年4月2日～<br>平成31年4月1日生まれ |                                        | 2回   | 1期<br><br>2期                    | 1歳の誕生日の前日から<br>2歳の誕生日の前日までに<br><br>令和6年度の接種期間:<br>令和6年4月1日～令和7年3月31日             | —<br><br>—                                          |                                             |
| 水痘<br>(みずぼうそう)                                               | 注射<br>生<br>ワクチン | 生後12か月から<br>36か月(3歳)に<br>至るまで                                                                      | 生後12か月から<br>15か月に達するまでに開始                                    |                                        | 2回   | 1回目<br><br>2回目                  | —<br>1回目から3か月以上の間隔を置いて                                                           | —<br>1回目から6～12か月の間隔                                 |                                             |
| 日本脳炎<br>(※通常対象者)                                             | 不活化<br>ワクチン     | 1期 生後6か月から<br>90か月(7歳半)に<br>至るまで<br><br>2期 9歳以上13歳未満                                               | 初回<br><br>追加                                                 | 3歳から<br>4歳に至るまで<br><br>4歳から<br>5歳に至るまで | 4回   | 1期<br>初回<br>2回目<br>追加<br><br>2期 | 1回目<br>1回目から6日(1週)以上の間隔を置いて<br>2回目から6か月以上の間隔を置いて<br>9歳の誕生日の前日から<br>13歳の誕生日の前日までに | —<br>1回目から1～4週の間隔<br>2回目から概ね1年の間隔<br><br>—          |                                             |
| 2種混合(DT)<br>ジフテリア・破傷風                                        | 不活化<br>ワクチン     | 11歳以上13歳未満                                                                                         | 11歳から12歳に至るまで                                                |                                        | 1回   | 2期                              | 11歳の誕生日の前日から<br>13歳の誕生日の前日までに                                                    | —                                                   |                                             |
| ヒトパペローマウイルス<br>(子宮頸がん予防)<br>HPVワクチン<br>(※通常対象者)              | 不活化<br>ワクチン     | 12歳となる日の<br>属する年度内<br>(小6)の女子から<br><br>16歳となる日の<br>属する年度内<br>(高1相当)の女子<br><br>※原則3回とも<br>同じワクチンを接種 | 2価 サーバリックス<br>の場合<br><br>中学1年生の女子                            |                                        | 3回   | 1回目<br>2回目<br>3回目               | —<br>1回目から1か月以上の間隔を置いて<br>1回目から5か月以上かつ2回目から<br>2か月半以上の間隔を置いて                     | —<br>1回目から1か月後<br>1回目から6か月後                         |                                             |
|                                                              |                 |                                                                                                    | 4価 ガーダシル<br>の場合<br><br>中学1年生の女子                              |                                        |      | 3回                              | 1回目<br>2回目<br>3回目                                                                | —<br>1回目から1か月以上の間隔を置いて<br>2回目から3か月以上の間隔を置いて         | —<br>1回目から2か月後<br>1回目から6か月後                 |
|                                                              |                 |                                                                                                    | 9価 シルガード9<br>の場合<br><br>中学1年生の女子                             |                                        |      |                                 | 3回                                                                               | 1回目<br>2回目<br>3回目                                   | —<br>1回目から1か月以上の間隔を置いて<br>2回目から3か月以上の間隔を置いて |
|                                                              |                 |                                                                                                    |                                                              |                                        | 2回   |                                 |                                                                                  | 1回目<br>2回目                                          | —<br>1回目から5か月以上の間隔を置いて<br>※5か月未満の場合は3回接種    |

#### ※小児用肺炎球菌(20価)について

令和6年10月1日から定期接種になりました。小児用肺炎球菌は原則、13価・15価から20価に切り替わります。  
これまで15価を接種された人は原則15価で接種を完了してください。これまで13価で接種された人は20価に切り替えて接種してください。

#### ※小児用肺炎球菌(15価)、5種混合について

令和6年4月1日から定期接種になりました。5種混合は、従来の4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)にヒブが追加されています。5種混合を完了した人は、4種混合とヒブの予防接種は必要ありません。

#### ※日本脳炎、HPV(子宮頸がん予防ワクチン)について

通常対象者以外の人でも、定期接種の対象になる場合があります。  
詳細は茨木市のホームページをご覧ください、茨木市立こども支援センターにお問い合わせください。



各予防接種の詳細



スケジュール表

接種の際は  
「母子健康手帳」を  
忘れずに!

「母子健康手帳」には、接種したワクチン名、接種日、ロットNo.及び接種医療機関等の大切な情報が記録されます。「母子健康手帳」を携帯せずに接種を受けると、接種記録が漏れてしまい、その後の接種に支障をきたす場合があります。そのため、「母子健康手帳」を忘れた場合には、接種しない方針をとっている医療機関もあります。「母子健康手帳」の記録は、予防接種の公的な証明になるため、お父さんが大きくなられても大切に保管してください。また近年、学校に入学する際や海外渡航の際に、接種証明の提出を求められる場合もあります。

母子健康手帳

問合せ先

茨木市 こども育成部 子育て支援課（おにクル2F 茨木市立こども支援センター内）  
〒567-0888 茨木市駅前三丁目9番45号 TEL072-624-9301

月～金曜日 8時45分から17時15分まで  
〔第2・4月曜日(祝日・振替休日と重なった場合は翌火曜日)、祝日、年末年始を除く〕