

接種後の副反応

接種後、数日以内に現れる可能性のある症状は下表のとおりです。いずれのワクチンも、接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛、悪寒、関節痛等、症状は類似しています。症状は翌日に出ることが多く、モデルナ社ワクチンでは接種後1週間程度経ってから接種部位に痛みや腫れ等が出るがありますが、大部分は数日以内に回復しています。副反応は年齢が若いほど、また女性に多く発生する傾向があり、1回目に比べて2回目の接種後に、発熱、倦怠感等の全身反応が多く発生しています。10代・20代の男性では、ファイザー社ワクチンよりモデルナ社ワクチンの方が、心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が高い傾向がみられました。また、追加（3回目）接種について、副反応は2回目の接種後と同程度ですが、リンパ節の腫れは3回目の方が多くみられます。なお、接種回数を問わず、まれにアナフィラキシー（重いアレルギー反応）がみられますが、接種会場や医療機関ではすぐに対応できるよう医薬品等の準備を整えています。

数日以内に現れる可能性	ファイザー社	モデルナ社
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛	接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛
10～50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、 発熱、接種部位の腫れ	関節痛、悪寒、吐き気、嘔吐、リンパ節症、 発熱、接種部位の腫れ、発赤・紅斑
1～10%	吐き気、嘔吐	接種後7日以降の接種部位の痛みや腫れ、紅斑

各種副反応等報告と専門家による評価について

4月13日現在で、厚生労働省が公表している各種副反応等報告と専門家による評価は下表のとおりです。それぞれの報告に関して、現時点でワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとされています。

各種副反応として 国に報告された件数	ファイザー社（12歳以上） 195,944,823回接種※1	モデルナ社 51,618,647回接種※4	アストラゼネカ社 116,640回接種※2
「死亡」	1,514件※1 α0件、β9件、γ1,505件	120件※4 α0件、β1件、γ119件	1件※2 α0件、β0件、γ1件
「アナフィラキシー」	3,208件※1 α605件、β4件、γ2,599件	541件※4 α56件、β0件、γ485件	5件※2 α0件、β0件、γ5件
「血栓症」	53件※2 α0件、β0件、γ53件	10件※2 α0件、β0件、γ10件	2件※2 α2件、β0件、γ0件
「心筋炎」	136件※3 α0件、β0件、γ136件	57件※3 α0件、β0件、γ57件	0件
「心膜炎」	43件※3 α0件、β0件、γ43件	11件※3 α0件、β0件、γ11件	0件

【評価記号について】 α＝ワクチンとの因果関係が否定できないもの、β＝ワクチンとの因果関係が認められないもの、γ＝情報不足等によりワクチンとの因果関係が評価できないもの

【集計期間】 ※1 昨年2月17日～今年3月20日、※2 昨年8月3日～今年3月20日、※3 昨年12月6日～今年3月20日、※4 昨年5月22日～今年3月20日

相談窓口

相談内容	問合先	電話番号等
接種の予約、 接種券（クーポン券）の 発行等に関する事	市コールセンター	☎ 0120・695・890（毎日、午前9時～午後5時） ☎ 072・625・1650（聴覚や発語に障害のある方のみ）
	市新型コロナワクチン専用窓口 ※接種の予約は受け付けていません	〒567-0888 駅前四丁目7-55、福祉文化会館101 （平日・日曜日、午前8時45分～午後5時45分）
副反応等、医療に関する事	府コールセンター	☎ 0570・012・336（24時間受付） ☎ 06・6635・2047 ☎ 06・6641・0072（聴覚障害のある方のみ）
コロナワクチン施策の 在り方等に関する事	厚生労働省新型コロナ ワクチンコールセンター	☎ 0120・761・770 （毎日、午前9時～午後9時）